



Warszawa, dnia 25.06.2019 r.

**MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI**

Znak sprawy: HOR.ns.8100.41.2019.42

DECYZJA Nr 554a/19

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. *o nawozach i nawożeniu* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259), po rozpatrzeniu wniosku spółki TRIPLUS Sp. z o. o., ul. Czerniakowska 145 lok. 1/B31, 00-453 Warszawa z dnia 03 czerwca 2019 r.

zmieniam

decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 554/19 z dnia 20 marca 2019 r. pozwalającą spółce TRIPLUS Sp. z o. o., ul. Czerniakowska 145 lok. 1/B31, 00-453 Warszawa na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego pn.: „TRIPLUS Aloe Vera” w ten sposób że, instrukcja stosowania i przechowywania tego nawozu otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 marca 2019 r. wydał decyzję Nr 554/19 pozwalającą spółce TRIPLUS Sp. z o. o., ul. Czerniakowska 145 lok. 1/B31, 00-453 Warszawa na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego pn.: „TRIPLUS Aloe Vera”.

W dniu 03 czerwca 2019 r. spółka TRIPLUS Sp. z o. o., ul. Czerniakowska 145 lok. 1/B31, 00-453 Warszawa wystąpiła do ministra właściwego do spraw rolnictwa z wnioskiem o zmianę treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozu organicznego pn.: „TRIPLUS Aloe Vera” poprzez rozszerzenie zakresu stosowania nawozu w uprawach polowych roślin rolniczych oraz uprawach leśnych.

TRIPLUS Sp. z o. o., ul. Czerniakowska 145 lok. 1/B31, 00-453 Warszawa przedstawiła:

- opinię Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach z dnia 20 maja 2019 r. znak NŻN.501.132.2019 o przydatności nawozu organicznego TRIPLUS Aloe Vera do stosowania w uprawach polowych wraz z zaakceptowaną instrukcją stosowania i przechowywania.
- opinię Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym z dnia 30 kwietnia 2019 r. o przydatności nawozu organicznego TRIPLUS Aloe Vera do stosowania w uprawach leśnych wraz z zaakceptowaną instrukcją stosowania i przechowywania.

Dokumenty te stanowiły dla Organu podstawę do wydania niniejszej decyzji.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.). Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 złotych.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) albo o przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243 § 1 tej ustawy.

Strona może również, stosownie do treści art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) oraz z częścią I ust. 53 pkt 1 kolumny pn. „Zwolnienia” w załączniku do tej ustawy dokonanie czynności urzędowej dotyczącej niniejszej decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.


„za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”

Otrzymuje:

TRIPLUS Sp. z o. o.
ul. Czerniakowska 145 lok. 1/B31
00-453 Warszawa

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną)

1. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
(kgz@ijhars.gov.pl)
2. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa – Wesola
(jgolebiewska@schr.gov.pl)
3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
(agrut@iung.pulawy.pl)



**Instrukcja stosowania i przechowywania nawozu organicznego
pn. „Triplus Aloe Vera”**

Zakres stosowania

„TriPlus Aloe vera” jest dolistnym i doglebowym nawozem organicznym pochodzenia roślinnego, zawierającym podstawowe składniki pokarmowe (azot, fosfor i potas), wyprodukowanym z aloesu z dodatkiem alg morskich, kwasów huminowych i melasy pochodzącej z trzciny cukrowej, z udziałem mikroorganizmów funkcjonalnych. Jest przeznaczony do stosowania w uprawach polowych roślin rolniczych, w uprawach roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, na wszystkie rodzaje gleb.

Dawki, terminy i sposób stosowania

Uprawy polowe roślin rolniczych

Nasiona, bulwy

Korzystne jest aby bezpośrednio przed wysiewem/sadzeniem lub w trakcie wysiewu/sadzenia nasiona/bulwy poddać kontaktowi z 1 % roztworem nawozu (oprysk, moczenie).

Nawożenie dolistne

Nawóz można stosować kilkakrotnie w czasie wegetacji w formie oprysku, w stężeniu od 3,0 % do 5,0% kolejne opryski wykonywać należy co 10-14 dni.

Zalecane dawki oprysku na wybrane uprawy

Zboża	3-5 l/200-300 l wody	2-3 zabiegi w czasie wegetacji począwszy od fazy krzewienia
Rzepak	3-5 l/200-300 l wody	2-3 zabiegi w czasie wegetacji począwszy od fazy rozety
Kukurydza	3-5 l/200-300 l wody	2-3 zabiegi w czasie wegetacji pierwszy w fazie 2-4 liści
Buraki cukrowe	3-5 l/200-300 l wody	2-3 zabiegi w czasie wegetacji pierwszy w fazie 2-3 liści
Ziemniaki	3-5 l/200-300 l wody	2-3 zabiegi w sezonie, pierwszy zabieg przy wysokości roślin 8-12 cm

Zaleca się nawożenie dolistne przed zapowiadanymi obfitymi opadami deszczowymi, a także przed okresami suszy.

Rośliny sadownicze

Nawożenie doglebowe/dokorzeniowe

Przed sadzeniem roślin. Równomiernie rozprowadzić na powierzchnię gleby roztwór roboczy o stężeniu 5 % w ilości 2 l/m², a następnie wymieszać do głębokości około 15 cm.

Przed sadzeniem roślin można ich korzenie moczyć przez 4-6 godziny w roztworze o stężeniu 0,5 %.

W sadach/plantacjach. Wczesną wiosną (w czasie nabrzmiewania/pęknięcia pąków) oraz bezpośrednio po kwitnieniu rozprowadzić roztwór o stężeniu 2 % wokół drzewek/krzewów lub wzdłuż rzędów roślin w ilości 2 l/m².

Nawożenie dolistne

- Sady/plantacje: opryskiwać drzewa/krzewy 3-4 razy w sezonie (szczególnie w warunkach ograniczających wzrost roślin) roztworem o stężeniu 0,5 %, zużywając 500-750 l wody na ha. Opryski rozpocząć bezpośrednio po kwitnieniu roślin lub na początku warunków stresowych. Kolejne opryski stosować co 7-14 dni.

Rośliny ozdobne

Przed sadzeniem roślin w gruncie (rośliny rabatowe, drzewa i krzewy ozdobne)

Wczesną wiosną na około 3-5 dni przed sadzeniem roślin rozprowadzić równomiernie nawóz po powierzchni gleby w miejscach sadzenia roślin w stężeniu 5 %, zużywając około 2 l roztworu na powierzchnię 1 m², a następnie wymieszać do głębokości około 15 cm.

Nawożenie pogłównie

Rośliny uprawiane w gruncie:

Rośliny młode lub o słabym wzroście oraz wrażliwe należy nawozić 3% roztworem, rośliny starsze lub o intensywnym wzroście należy nawozić 5,0 % roztworem nawozu. Przygotowanym roztworem podlewać rośliny co 14 dni od kwietnia do końca sierpnia, zużywając około 2 l roztworu na powierzchnię 1 m².

Rośliny doniczkowe i balkonowe:

W okresie od kwietnia do października w odstępach 7-10 dniowych, w zależności od wymagań roślin należy, podlewać rośliny 0,1-1,0 % roztworem nawozu. W okresie zimowym rośliny domowe należy nawozić 1,0 % roztworem nawozu 1 raz w miesiącu.

Nawożenie dolistnie

W fazie wzrostu vegetatywnego stosować w formie oprysku 3-4 razy w sezonie, zwłaszcza w warunkach ograniczających wzrost roślin (stresowych) roztwór o stężeniu 0,3-0,5 %.

Rośliny warzywne

Wczesną wiosną na około 5-10 dni przed wysiewem nasion/sadzeniem rozsady warzyw rozprowadzić równomiernie nawóz na powierzchni gleby roztworem w stężeniu 1-5 %, zużywając około 20 l roztworu na powierzchnię 10 m² i wymieszać z glebą do głębokości około 15 cm.

Nawożenie pogłównie

Warzywa uprawiane w gruncie

Pierwsze zabiegi nawożenia roślin (po wschodach i ukorzenieniu się rozsady) przeprowadzić roztworem nawozu w stężeniu 2,0-3,0 %. Rośliny starsze i silniej o rosnące nawozić roztworem nawozu w stężeniu 5,0 %. W okresie wegetacji podlewać rośliny co 14 -21 dni od początku wegetacji do pierwszych zbiorów w ilości około 20 l na 10 m² powierzchni.

Warzywa uprawiane pod osłonami

W okresie wzrostu wegetacyjnego i w czasie owocowania nawozić rośliny w odstępach 7-14 dniowych. W zależności od wymagań roślin należy podlewać rośliny 0,1-1,0 % roztworem nawozu. Gatunki o silnym wzroście (pomidor, ogórek, papryka) podlewać roztworem o wyższej koncentracji nawozu.

Nawożenie dolistnie

Nawóz można stosować kilkakrotnie w czasie uprawy w formie oprysku, w stężeniu 0,3-0,5%.

Uprawy leśne

Nawożenie dogłębowe/dokorzeniowe:

Przed sadzeniem roślin równomiernie rozlać roztwór nawozu w stężeniu 5,0 % na powierzchnię gleby w dawce 80ml/m² a następnie wymieszać do głębokości około 15 cm.

Przed sadzeniem roślin można ich korzenie moczyć w roztworze o stężeniu 0,5% przez 4-6 godzin.

Nawożenie dolistne:

Stężenie roztworu użytkowego zależy od gatunku i wieku roślin, najczęściej wynosi 2,0-5,0 %. Optymalne stężenie dla młodych 2-3 tygodniowych roślin świerka, sosny, modrzewia wynosi 1:30 - 35 tzn. 1 l nawozu na 30-35 l wody.

Dla roślin starszych stężenie można zwiększyć do 1:20 - 25.

Dla jodły i daglezi stosuje się roztwór o mniejszym stężeniu 1:40-50.

TRIPLUS Aloe Vera stosuje się opryskując rośliny (igły) przy użyciu aparatury ochrony roślin, stosując możliwie drobne rozpylanie, zapewniające równomierne naniesienie roztworu. Można również wykorzystać do tego celu deszczownię wyposażoną w dozowniki i dysze zamglawiające.

Dla zapewnienia optymalnego zaopatrzenia roślin w makro i mikroelementy na powierzchnię 1 ha upraw leśnych zapotrzebowanie wynosi ok. 500 l koncentratu o stężeniu 0,5% na jeden sezon wegetacyjny (rok). Dawkę tę rozkłada się na 10 oprysków każdorazowo stosując ok.50 l koncentratu na hektar.

Terminy stosowania:

Pierwsze nawożenie TRIPLUS Aloe Vera siewek przeprowadza się w 2-3 tygodnie po wschodach, a następnie co 10-14 dni aż do momentu wykształcenia pędu szczytowego.

Rośliny starsze nawozi się po ruszeniu wegetacji, szczególnie w momencie wykształcenia się młodego igliwia.

Terminy nawożenia są ustalane przez bezpośredniego użytkownika w zależności od rodzaju roślin, intensywności wzrostu oraz doraźnych potrzeb, np. wynikających z żółknięcia igieł czy zahamowania wzrostu.

W uprawach leśnych

- TRIPLUS Aloe Vera należy stosować nie dłużej niż do końca czerwca ze względu na konieczność zdrewniania przyrostów roślin przed zimą. W przypadku żółknięcia igieł z powodu braku niezidentyfikowanego składnika pokarmowego można opryskać rośliny doraźnie w terminie późniejszym.
- Nie należy stosować nawozu w dni słoneczne przy temperaturze powyżej 20°C. optymalne warunki nawożenia dolistnego to duża wilgotność powietrza i temperatura 8-20°C.
- Nie stosować w szkółkach i uprawach drzew iglastych o odczynie podłoża poniżej 5,0 pH.

Przygotowanie roztworu użytkowego:

- 1) wstrząsnąć pojemnikiem wypełnionym nawozem
- 2) wlać odmierzoną ilość nawozu do częściowo wypełnionego opryskiwacza/pojemnika do podlewania
- 3) dobrze wymieszać nawóz z wodą
- 4) uzupełnić opryskiwacz/pojemnik do podlewania wodą do wymaganej objętości Roztwór należy użyć bezpośrednio po jego przygotowaniu.
- 5) przygotowanie roztworów:
 - roztwór 5%: 5 litrów nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów
 - roztwór 3%: 3 litry nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów
 - roztwór 2%: 2 litry nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów
 - roztwór 1%: 1 litr nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów
 - roztwór 0,5%: 0,5 litra nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów
 - roztwór 0,3%: 0,3 litra nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów
 - roztwór 0,2%: 0,2 litra nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów
 - roztwór 0,1%: 0,1 litra nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów

UWAGA:

- Zabrania się stosowania nawozu na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia;
- Nawóz nie jest przewidziany do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin;
- Nie przekraczać zalecanych dawek

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-25°C.

Opakowania należy chronić przed bezpośrednią ekspozycją na słońce.

Produkt należy chronić przed ekspozycją na temperaturę poniżej 0°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w miejscach nieprzeznaczonych do przechowywania żywności.

Środki ostrożności

Podczas stosowania nawozu zachować powszechnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza.